

(9)

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 55-111411

(43)Date of publication of application : 28.08.1980

(51)Int.Cl.

A61K 7/00

A61K 7/42

(21)Application number : 54-018753

(71)Applicant : SANSHO SEIYAKU KK

(22)Date of filing : 19.02.1979


(72)Inventor : HONDA GORO

## (54) COSMETIC FOR MAKING FAIR SKIN

## (57)Abstract:

PURPOSE: A cosmetic for making fair skin that contains a flavonol analog as an effective component, thus showing strong activities of making fair skin and preventing sunburn.

CONSTITUTION: Said cosmetic for making fair skin contains 0.01W10wt% of a flavonol analog of the formula (R1, R2, and R4 are H, hydroxyl, methoxy; R3, R5, and R6 are H, hydroxyl), e.g., myricetin, rhamnetin, however, quercetin is excluded). The compounds of the formula, themselves, have strong activity of inhibiting tyrosinase activity and further high oxidation resistance and ultraviolet absorption. Therefore, the cosmetic increases the stabilities to light and pH and shows extremely high storage stability. It is harmless to human bodies at all. The compounds of the formula, the effective component, is obtained by reaction between a corresponding flavanone, amyl nitrite and hydrochloric acid, and hydrolyzing the resulting isonitroso derivative with an acid. These compounds are required to have a hydroxyl group in the 3-position.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭55—111411

⑪ Int. Cl.<sup>3</sup>  
A 61 K 7/00  
7/42

識別記号

庁内整理番号  
7432—4C  
6755—4C

⑬ 公開 昭和55年(1980)8月28日

発明の数 1  
審査請求 有

(全 5 頁)

⑭ 色白化粧品

福岡県筑紫郡太宰府町大字大佐野

⑮ 特 願 昭54—18753  
⑯ 出 願 昭54(1979)2月19日  
⑰ 発 明 者 本田五郎

⑱ 出 願 人 三省製薬株式会社  
大野城市大字筒井1丁目6番地  
⑲ 代 理 人 弁理士 朝日奈宗太


明 細 書

1 発明の名称

色白化粧品

2 特許請求の範囲

1 一般式 (I)



(式中、 $R_1$ 、 $R_2$  および  $R_4$  は H、OH または  $OCH_3$ 、 $R_3$ 、 $R_5$  および  $R_6$  は H または OH である) を有するフラボノール系化合物 (ただし、クエルセチンを除く) を有効成分とする色白化粧品。

2 フラボノール系化合物の含有量が 0.01~10 重量百分である特許請求の範囲第 1 項記載の化粧品。

(1)

3 発明の詳細な説明


本発明は新規な色白化粧品に関する。さらに詳しくは、フラボノール系化合物を有効成分として含有せしめた美白効果および日焼防止効果の大なる色白化粧品に関する。

色白の美しい肌になりたいと願うのは女性の常であり、従来より過酸化水素、過酸化亜鉛、過酸化マグネシウム、過酸化ナトリウム、過ホウ酸亜鉛、過ホウ酸マグネシウムまたは過ホウ酸ナトリウムなどの過酸化物を配合した化粧品が広く使用されていた。しかしながら前記のごとき過酸化物は保存性、物性的または化学的安定性あるいは化粧品への配合性の面で問題があり、かつその美白効果も充分ではなかつた。近年になつて、ビタミン C、システイン、コロイド硫黄などを配合した化粧品が開発され實用されているが、これらととてもなお充分に満足しうる保存性、安定性および美白効果を有するものとはいえない。

これに対し本発明者は、さきにフラボノール

(2)

系であるクエルセチンがその美白効果および日  
 焼防止効果にすぐれた活性を有しているという  
 新たな事実を見出し、特許出願（特願昭53-  
 165303号）をしたが、さらに本発明者は鋭意研  
 究を重ねた結果、他のフラボノール系化合物が  
 前記クエルセチンと同様に人体皮膚内に存在す  
 るチロジナーゼの活性を阻害して顕著なメラニ  
 ン生成抑制作用を示すと共に、すぐれた抗酸化  
 作用や紫外線吸収作用を示し、そのためすぐれた  
 美白効果および日焼防止効果を示し、さらにこ  
 のものはクエルセチンと同様に pH、光、熱など  
 に対する安定性が大きく保存性がよくなる良好  
 であるなどの顕著な効果を示しうるという新た  
 な事実を見出し、本発明を完成するに至った。  
 すなわち本発明は、一般式(I)：



(a)

トキシーフラボノールなどがあげられ、これら  
 化合物は1種または2種以上を混合して使用さ  
 れる。

これらの化合物は、たとえば相当するフラベ  
 ノン系化合物に亜硝酸アミルと塩酸を反応させ、  
 えられたイソニトロソ誘導体を酸で加水分解す  
 る方法 (St. v. Kostanecki et al., Ber., 37,  
 773, 1402 (1904) および小沢光ら、薬誌, 71,  
 1183 (1951)) を利用して生成される。

本発明におけるフラボノール系化合物に類似  
 する化合物としては、前記一般式(I)において3  
 位に水酸基を有さないフラボン系化合物があげ  
 られるが、かかるフラボン系化合物はインビ  
 トロにおいてチロジナーゼ活性阻害能力を殆んど  
 有しないものである。また前記フラボノール系  
 化合物において、3位の水酸基で配糖体となる  
 ばあい（たとえばルチン、クエルシトリンなど）  
 も、同様に殆んどチロジナーゼ活性阻害能力を  
 有しない。

本発明における前記フラボノール系化合物は

(b)

(式中、 $R_1$ 、 $R_2$  および  $R_4$  は H、OH または  $OOH_3$ 、  
 $R_5$ 、 $R_6$  および  $R_6$  は H または OH である) を有す  
 るフラボノール系化合物（ただし、クエルセチ  
 ンを除く）を有効成分とする色白化粧料を提供  
 するものである。

すなわち本発明の色白化粧料はその有効成分  
 としてクエルセチンを除くフラボノール系化合  
 物を含むものである。

かかるフラボノール系化合物はそれ自体強力  
 なチロジナーゼ活性阻害能力を有し、かつすぐ  
 れた抗酸化作用や紫外線吸収作用を有すると共  
 に、光、pH に対する安定性が增加して保存安定  
 性がきわめて良好であるなどのすぐれた美白効  
 果および日焼防止効果を示しうると共に、人体  
 に対してまったく無害である。

本発明における前記一般式(I)を有するフラボ  
 ノール系化合物の具体例としては、たとえば従  
 来公知のミリセチン、ラムネチン、ロビネチン、  
 クリソスプレネチン、ダチスセチン、フィセチ  
 ン、ガラングン、ヘルベセチン、5, 7-ジメ

(c)

その3位に水酸基を有しており、そのためその  
 2、3 および 4 位においておそらくケト-エノ  
 ール形の互変異性をとり、かつきわめて複雑な  
 共鳴現象を起しているものと考えられる。しか  
 して本発明におけるフラボノール系化合物は、  
 その3位に水酸基を有していることによる前述  
 のごとき現象によつて、強力にチロジナーゼ活  
 性を阻害するものと考えられる。

本発明の色白化粧料は適宜の化粧料基材にか  
 かるフラボノール系化合物を含むものであるが、  
 該フラボノール系化合物の含有量と  
 しては通常  $0.01 \sim 10\%$  程度、なかんづく  $0.05 \sim$   
 $0.5\%$  程度の範囲が採用される。ただし、かかる  
 範囲内で十分に満足しうる美白効果、日焼防止  
 効果が得られるのであつて前記範囲より多量  
 に含有せしめるときはそれに見合う実益がとも  
 なわず、一方前記範囲より少なく含有せしめ  
 るときは美白効果、日焼防止効果の面で若干の不安  
 が残るからである。

以上述べたごとく本発明の色白化粧料は、美

(d)

白剤および日焼防止剤としてフラボノール系化合物を含有せしめることにより、従来品の欠点を克服しえたものであつて、用いる化粧料基材などによつて何ら制限されるものではない。したがつて本発明においては、化粧料基材として従来より多用されている種々の基礎化粧料基材、たとえば各種アルコール類、動植物脂肪、界面活性剤、ペクチン、カルボキシメチルセルロース、アルギン酸塩、さらには安定剤、色素、香料およびその他の成分を適宜配合し、要すれば加熱溶融または溶融攪拌したものなどがすべてそのまま採用可能である。

つぎに実施例、比較例および処方例をあげて本発明の色白化粧料を説明する。

#### 実施例 1～10

次表に示す各フラボノール系化合物をそれぞれエタノールに溶解し、コハク酸あるいは炭酸カリウムでpHを6.0に調整して次表に示す濃度を有する各リニメント剤をえた。

(7)

て、37℃の恒温水槽中で10分間インキュベートしたのち、これにチロジナーゼ溶液(1mg/ml)を0.1ml加えてよく攪拌し、ただちに分光光度計にセツトして475mμにおける吸光度を経時的に測定した。一方、ブランクテストとして前配リニメント剤の代わりに水を用いて同様の吸光度測定を行なつた。

#### 比較例 1 および 2

フラボノール系化合物に代えてフラボン系化合物であるフラボンおよびルテオリンをそれぞれ用いた場合は実施例 1 と同様にして濃度0.25%の各リニメント剤を調製し、それらのチロジナーゼ活性阻害能力を調べた。

#### 比較例 3

フラボノール系化合物に代えてルチンを用いた場合は実施例 1 と同様にして濃度0.5%のリニメント剤を調製し、そのチロジナーゼ活性阻害能力を調べた。

前記実施例 1 および比較例 1～3 における各試験結果を添付図面(グラフ)に示す。このグ

(8)

実施例番号	フラボノール系化合物	リニメント剤中の濃度(%)
1	ミリセチン	0.25
2	ラムネチン	0.25
3	ロビネチン	0.20
4	クリソスブレネチン	0.30
5	ダチスセチン	0.20
6	フィセチン	0.25
7	ガラングイン	0.25
8	ヘルバセチン	0.25
9	5,7-ジメチルフラボノール	0.25
10	{ ミリセチンとダチスセチンとの重量比で 1:1 の混合物	0.25

かくしてえられた各リニメント剤のチロジナーゼ活性阻害能力を調べた結果をつぎに説明する。

試験管にL-チロジン溶液(0.3mg/ml)を1ml、マフクルペイン氏の緩衝液(pH6.8)を1ml、および前配リニメント剤の0.9mlを加え

(9)

ラフから実施例 1 でえたりニメント剤は比較例 1～3 でえた各リニメント剤に比べて顕著なチロジナーゼ活性阻害能力を有していることがわかる。また実施例 2～10 でえた各リニメント剤のチロジナーゼ活性阻害能力は実施例 1 でえたりニメント剤のそれとほぼ同じであつた。

つぎに本発明の色白化粧料の処方例を列举するが本発明はもとよりこれらの処方例のみに限定されるものではない。

#### 処方例 1 [ローション]

(成分)	(重量部)
ミリセチン	0.10
アミノ酢酸	0.20
塩酸ピリドキシン	0.05
フェノールスルホン酸亜鉛	0.30
プロピレングリコール	8.00
エタノール	5.00
精製水	86.35
香料および防腐剤	少量

#### 処方例 2 [バツク]

(10)

( 成 分 )	( 重量部 )
フィセチン	0.10
ステアリン酸	4.00
アミノ酢酸	0.20
フェノールスルホン酸亜鉛	0.30
プロピレングリコール	13.00
カルボキシビニルポリマー	1.20
水酸化ナトリウム	0.14
エタノール	2.50
酸化チタン	0.02
精製水	82.54
香料および防腐剤	少 量

## 処方例 3 [ ベンタ ]

( 成 分 )	( 重量部 )
ダチスセチン	0.10
ポリビニルアルコール	15.00
ポリビニルピロリドン	4.00
ステアリン酸	2.00
フィーン 20	2.00
スパン 60	0.50

プロピレングリコール	6.00
エタノール	10.00
精製水	69.70
香料および防腐剤	少 量

## 処方例 4 [ ミルクローション ]

( 成 分 )	( 重量部 )
フィセチン	0.20
ステアリン酸	2.00
セタノール	0.50
ラノリン	2.00
オレイルオレエート	2.00
スクワラン	3.00
流動パラフィン	8.00
乳化剤	2.60
トリエタノールアミン	1.00
プロピレングリコール	4.00
精製水	74.90
香料、酸化防止剤および防腐剤	少 量

## 処方例 5 [ ベニシダクリーム ]

( 成 分 )	( 重量部 )
---------	---------

ガラシギン	0.20
MC ステアリン酸	8.00
ミツロウ	5.00
セタノール	3.00
ラノリン	2.00
ミリスチン酸イソプロピル	6.00
流動パラフィン	7.00
オリーブ油	2.00
乳化剤	5.50
トリエタノールアミン	0.60
プロピレングリコール	3.00
精製水	57.70
香料、酸化防止剤および防腐剤	少 量

## 処方例 6 [ コールドクリーム ]


( 成 分 )	( 重量部 )
ラムネチン	0.10
ミツロウ	10.00
セレシン	7.00
白色ワセリン	3.00
ラノリン	3.00

ミリスチン酸イソプロピル	30.00
スクワラン	4.00
流動パラフィン	40.00
ポリオキシエチレンセチルエーテル	2.70
乳化剤	2.30
プロピレングリコール	2.00
精製水	23.00
香料、酸化防止剤および防腐剤	少 量

## 4 図面の簡単な説明

図面は実施例 1 および比較例 1～3 でえた各リニメント剤のチロジナーゼ活性阻害能力を示すための着色度と時間との関係を示すグラフである。

特許出願人 三省製薬株式会社  
代理人 弁護士 朝日 泰 宗



19201 1060 3 1060 1060

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**